




Евразийская коалиция
по мужскому здоровью

90-90-90

Анализ каскада комплексных услуг
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
среди MSM в странах ЦВЕЦА




В 2018 году не более 4 из 10 инфицированных ВИЧ геев и других МСМ в Восточной Европе и Центральной Азии, знали о наличии у них ВИЧ-инфекции. Поэтому большинство из них до сих пор не получают необходимого им лечения и поддержки, а бесконтрольное распространение ВИЧ-инфекции среди МСМ продолжается. К такому выводу приводит анализ каскадов услуг профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для МСМ, проведенный ЕКОМ.

С другой стороны, проведенный анализ показывает, что более 60% из тех МСМ, кто знает о своем ВИЧ-статусе и обратился за лечением, уже получают современную АРВ терапию. А 79% тех, кто получает АРВ терапию более 12 месяцев, достигли неопределяемого

уровня вирусной нагрузки, то есть ВИЧ не может перейти от них к другим людям, и здоровье самих ВИЧ-позитивных мужчины также защищено.

Среди основных причин, которые препятствуют геям и другим МСМ проходить тестирование на ВИЧ и получать эффективное лечение, исследователи назвали медленное внедрение в странах инновационных программ тестирования, среди которых тестирование на базе ЛГБТ организаций и самотестирование. Другим значительным препятствием является высокий уровень стигмы и частые случаи дискриминации, которые геи, другие МСМ встречают при обращении за помощью в области сексуального здоровья.

Каскад. Результаты: охват услугами



- Оценочное число ВИЧ-позитивных МСМ в стране (абсолютные цифры, данные 2016-18 гг.)
- Число и процент ВИЧ+ МСМ, знающих о своем ВИЧ+ статусе
- ВИЧ+ МСМ, получающие АРВ терапию
- ВИЧ+ МСМ, получающих АРВ терапию, у кого достигнута неопределяемая вирусная нагрузка

	Оценочное число ВИЧ-позитивных МСМ в стране	Число и процент ВИЧ+ МСМ, знающих о своем ВИЧ+ статусе	ВИЧ+ МСМ, получающие АРВ терапию	ВИЧ+ МСМ, получающих АРВ терапию, у кого достигнута неопределяемая вирусная нагрузка
Армения	100	75 / 75%	55 / 73,3%	39 / 71%
Беларусь	4621	259 / 5,6%	211 / 81,5%	172 / 81,5%
Грузия	4490	640 / 14%	479 / 75%	422 / 88%
Кыргызстан	1115	135 / 12,1%	76 / 56,3%	49 / 64,5%
Македония	1092	165 / 15%	123 / 75%	109 / 89%

Анализ проведен на основе отчетов о каскадах комплексных услуг профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди МСМ из 9-ти стран региона. В Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии сбор соответствующих данных был проведен организации сообщества ЛГБТ и ЛЖВ при технической поддержке ЕКОМ и финансировании от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Информация о ситуации в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане была взята из отчетов о проектах, проведенных в этих странах другими организациями. (Полный текст регионального обзора будет опубликован до конца 2018 года.)

В рамках сбора и анализа данных для каскада, члены и партнерские организации ЕКОМ в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии работали в тесном сотрудничестве с экспертами национальных министерств здравоохранения и сотрудниками центров СПИД.

В дальнейшем, ЕКОМ планирует поддерживать своих членов и партнеров для регулярного сбора данных о каскаде услуг по ВИЧ для МСМ и транс людей, и использовать эти данные для развития сотрудничества с правительственными и международными организациями.


Отдельной темой для сотрудничества является улучшение качества данных об охвате и содержании услуг профилактики, лечения и поддержки в связи с ВИЧ для МСМ и транс людей. Так, в ходе сбора данных, исследователи отметили, что в ряде стран отсутствуют достоверные оценки численности МСМ, нет национальных пакетов услуг для ключевых групп и стандартов оказания услуг профилактики и поддержки для МСМ и транс людей в связи с ВИЧ, нет качественных оценок удельной стоимости услуг профилактики, и нет дезагрегированных данных об охвате различными услугами профилактики и лечения отдельных ключевых групп, таких как МСМ, транс люди, люди, употребляющие наркотики и секс-работники.

Низкий уровень доверия МСМ к провайдером услуг в области сексуального здоровья является одним из ключевых факторов, влияющих на качество статистических данных. Например, нежелание МСМ информировать сотрудников здравоохранения о своем сексуальном поведении ведет к искажению статистики на всех этапах мониторинга, начиная с определения количества ВИЧ-положительных МСМ, знающих о своем статусе, и заканчивая подсчетом числа тех ВИЧ-положительных МСМ, кто получает АРВ терапию и достиг неопределяемой вирусной нагрузки.

Каскад услуг – это инструмент мониторинга, с помощью которого можно оценить успешность национальных анти-ВИЧ программ, в том числе в той их части, которая касается профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей. Для мониторинга успешности ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции ООН предложил использовать каскад из 3 взаимосвязанных индикаторов, называемый «90-90-90»: 90% людей, живущих с ВИЧ должны получить возможность узнать о своем ВИЧ-статусе, не менее 90% тех, кто знает о своем ВИЧ-статусе, должны иметь доступ к АРВ терапии, которая должна быть настолько эффективна, чтобы 90% тех, кто ее получает, достигли бы неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

Каскад. Результаты:

МСМ в сравнении с другими группами населения (пример Грузии)



Автор: Геннадий Рощупкин

Координатор развития систем сообществ
для охраны здоровья ЕКОМ
gena@ecom.ngo



Eurasian Coalition on Male Health
www.ecom.ngo
contact@ecom.ngo
+372 634 6257
fb.com/ecom.ngo @ecomngo
Tartu mnt 63, 10115, Tallinn, Estonia