



*Eurasian Coalition  
on Male Health*

# Потребности транс людей: сломать стену невидимости!

Анализ данных показывает:  
потребности транс людей в сфере ВИЧ  
по-прежнему не принимаются во внимание в ВЕЦА



## Анализ данных показывает: потребности транс людей в сфере ВИЧ по-прежнему не принимаются во внимание в ВЕЦА

ЕКОМ представляет первый анализ эпидемиологических данных по ВИЧ среди транс людей.

Как показало наше кабинетное исследование, надежных и унифицированных данных по этой теме крайне мало.

Интегрированные биоповеденческие исследования (ИБПИ) по ВИЧ среди транс людей проводились только в четырех странах региона. Поскольку все страны проводили такие исследования впервые, полученных данных недостаточно для определения эпидемиологических тенденций.

К сожалению, это подтверждает тот факт, что потребности транс людей, связанные с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии часто не принимаются во внимание.

В рамках своей региональной программы «Право на здоровье» ЕКОМ работает над созданием доказательной базы по вопросам здоровья и прав геев и других МСМ, а также транс людей в данном регионе.


ЕКОМ провел ряд исследований, которые продемонстрировали нехватку или отсутствие информации в отношении транс людей.

По данным [исследования правовой среды](#), в большинстве стран отсутствуют нормативные документы, регулирующие вопросы гендерного перехода, юридической смены пола, здравоохранения и другие важные вопросы, касающиеся повседневной жизни транс людей. [Исследование по участию сообществ](#) показало, что транс люди представлены в национальных органах, принимающих решения по вопросам ВИЧ, только в двух странах региона. Несмотря на то, что транс люди подвергаются чрезвычайно высокому риску инфицирования ВИЧ, они определены в национальных стратегиях по ВИЧ/СПИДу как целевая группа, отдельно от МСМ, только в 5 странах региона ВЕЦА.

Представляемый сегодня эпидемиологический обзор, равно как и предыдущие исследования, показывает, что транс люди и их потребности по-прежнему остаются невидимыми в контексте ответа на ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Миссия ЕКОМ состоит в создании благоприятной среды, в которой все геи, бисексуалы и другие МСМ и **все транс люди** будут иметь доступ к научно-обоснованным и основанным на правах человека услугам здравоохранения, в т. ч. к профилактике и лечению ВИЧ.

В рамках своих обязательств по защите здоровья и прав транс людей ЕКОМ создает консультативную группу транс людей, которая объединит экспертов из сообщества для того, чтобы сломать стену невидимости.



## Данные по транс людям в странах ЦВЕЦА

по состоянию на февраль 2019 г.

Сбор данных: А. Постнов

	Оценка численности	Год исследования	% ВИЧ	размер выборки	% сифилис	% осведомленность	% охват	% тестирование	% презервативы
Азербайджан									
Албания									
Армения		2018	2 <sup>§</sup> [1]	90 <sup>§</sup> [1]	1 <sup>§</sup> [1]	70,3 <sup>§</sup> [1]	82,3 <sup>§</sup> [1]	89,9 <sup>§</sup> [1]	97,5 <sup>§</sup> [1]
Беларусь							84* † [2]		
Босния и Герцеговина									
Грузия									
Казахстан		2016		28 <sup>†</sup> [3]			88 † [2]	47,6*# ≈ [3]	
Косово									
Кыргызстан		2016		36 <sup>†</sup> [3]				44,5*# ≈ [3]	
Латвия									
Литва									
Сев. Македония									
Молдова							60,7* † [2]		
Россия									
Сербия									
Таджикистан									
Туркменистан									
Узбекистан									
Украина		2018 <sup>†</sup>	21*# [4]				12* [4]	29* [4]	31,1* [4]
Черногория									
Эстония									

Вирусная нагрузка; распространенность гепатитов В и С; транс люди ВИЧ+, знающие статус - данные отсутствуют.

\* подгруппы трансгендеров не идентифицированы

§ - транс женщины

£ - транс мужчины

† - формирование выборки методом snowball

# - оценка по самодекларации респондентов

‡ - использование любых услуг в ВИЧ-сервисных организациях

† - по всей видимости, использованы программные данные (процент выполнения планов охвата)

≠ - качественное исследование, выборка «по удобству»

≈ - оценка частоты прохождения теста на ВИЧ в целом ( не за последний год)

На отсутствие данных о размерах популяции, распространенности ВИЧ и других ИПСШ и основных поведенческих характеристиках группы трансгендеров в странах ЦВЕЦА указывают систематические и мета-анализы: 2008 г. (Operario et al [5]), 2013 г. (Baral et al [6]), 2014 г. (Poteat et al [7]) Sabin et al [8], 2016 г. (Reisner, Murchison [9], Poteat et al [10]), публикации международных организаций и организаций сообществ UNAIDS, 2014 [11], WHO, 2015 [12], UNDP, 2015 [13], 2017 [14], International Reference Group on Transgender People and HIV/AIDS, 2016 [15], WHO, 2018 [16]

## Ресурсы сообществ врачей, исследовательских и ТГ

www.avert.org, www.outcarehealth.org, www.ilga-europe.org, pravo-trans.eu, www.hrc.org, tran, sresp.ect.org, transformation-russia.com www.transcoalition.net, transglobalactivism.org, transactivists.org, lgbti-era.org, advocatesforyouth.org, www.juventas.co.me, www.queermontenegro.org, www.transbalkan.org, transserbia.org, transaid.hr, www.hplgbt.org, www.labrys.kg, www.gender.by, etc.

## Ссылки

- [1] Johnston, L. G. (2018) Integrated Biological-Behavioral Surveillance Survey among People Who Inject Drugs, Female Sex Workers, Men Who Have Sex with Men and Transgender Persons. Yerevan.
- [2] UNAIDS (2018) UNAIDS DATA.
- [3] ОО "Лабрис" and ОО "Кыргыз Индиго," "Оценка потребностей трансгендеров," 2016.
- [4] И. Медвидь, "Исследование поведения и потребностей трансгендеров в услугах по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине," Киев, 2018.
- [5] D. Operario, T. Soma, and K. Underhill, "Sex Work and HIV Status Among Transgender Women," *JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr.*, vol. 48, no. 1, pp. 97–103, May 2008.
- [6] S. D. Baral, T. Poteat, S. Strömdahl, A. L. Wirtz, T. E. Guadamuz, and C. Beyrer, "Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis," *Lancet. Infect. Dis.*, vol. 13, no. 3, pp. 214–22, Mar. 2013.
- [7] T. Poteat, S. L. Reisner, and A. Radix, "HIV epidemics among transgender women," *Curr. Opin. HIV/AIDS*, vol. 9, no. 2, pp. 168–73, Mar. 2014.
- [8] K. Sabin, J. Zhao, J. M. Garcia Calleja, Y. Sheng, S. Arias Garcia, A. Reinisch, and R. Komatsu, "Availability and Quality of Size Estimations of Female Sex Workers, Men Who Have Sex with Men, People Who Inject Drugs and Transgender Women in Low- and Middle-Income Countries," *PLoS One*, vol. 11, no. 5, p. e0155150, May 2016.
- [9] S. L. Reisner and G. R. Murchison, "A global research synthesis of HIV and STI biobehavioural risks in female-to-male transgender adults," *Glob. Public Health*, vol. 11, no. 7–8, pp. 866–87, 2016.
- [10] T. Poteat, A. Scheim, J. Xavier, S. Reisner, and S. Baral, "Global Epidemiology of HIV Infection and Related Syndemics Affecting Transgender People," *J. Acquir. Immune Defic. Syndr.*, vol. 72 Suppl 3, no. Suppl 3, pp. S210–9, 2016.
- [11] UNAIDS, *The Gap Report 2014*. 2014.
- [12] WHO, "Трансгендеры и ВИЧ-инфекция," 2015.
- [13] Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, and United Nations Development Programme, "Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and the Pacific," 2015.
- [14] UNDP, "Being LGBTI in Eastern Europe: Serbia country report," 2017.
- [15] International Reference Group on Transgender People and HIV/AIDS, "Counting Trans People In: Advancing Global Data Collection on Transgender Communities and HIV," 2016.
- [16] European Centre for Disease Prevention and Control and WHO Regional Office for Europe, *HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 – 2017 data*. Copenhagen, 2018.



Текст подготовлен: В. Джума, М. Касянчук, А. Постнов, П. Сабелашвили

Публикация подготовлена и опубликована в рамках региональной программы «Право на здоровье», реализуемой Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ) при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

При использовании материалов обязательным является ссылка на Евразийскую коалицию по мужскому здоровью (ЕКОМ)